

Tonsillite, ascessi



MedPop

HOME [◇](#) [.php](#) [◇](#) [.html](#) [◇](#) [.pdf](#) Contatto: [Bianca Buser](#) Categoria: [Fitoterapia](#) [◇](#) [Otorinolaringoiatria](#) [◇](#) [Tonsillite](#) [◇](#)

Su questa pagina ... (sopprimi)

1. [Tonsillite, ascessi](#)
2. [Osservazioni](#)
3. [Allegati](#)
 - 3.1 [Motori di ricerca](#)
 - 3.2 [Collegamenti](#)
 - 3.3 [Commenti](#)

La **tonsillite** o faringotonsillite è un'infezione delle tonsille, sindrome in cui troviamo la flogosi della Faringe. Capita spesso che tale infiammazione sia accompagnata con altre sempre di livello respiratorio quale ad esempio l'influenza.



1. Tonsillite, ascessi

Foglietto illustrativo 17996

[Pagine sul tema Otorinolaringoiatria](#)

[Asma bronchiale](#) [◇](#) [Bronchite allergica \(asmatica\)](#) [◇](#) [Foglietti illustrativi: indice](#) [◇](#) [Infezioni orecchie](#) [◇](#) [Infezioni orecchie: ausiliario](#) [◇](#) [Infezioni otorinolaringoiatriche, Inalazione](#) [◇](#) [Laringite, Raucedine](#) [◇](#) [Mal d'orecchie 1](#) [◇](#) [Mal di gola, faringite](#) [◇](#) [Mal di orecchie 2](#) [◇](#) [Naso tappato, Cura mucosi nasale](#) [◇](#) [Naso tappato, Doccia nasale](#) [◇](#) [Otite 1](#) [◇](#) [Otite 2](#) [◇](#) [Otite recidiva](#) [◇](#) [Sinusite, Impacchi](#) [◇](#) [Sinusite, Inalazione](#) [◇](#) [Tosse & catarrhi](#) [◇](#)

[Abbreviazioni galeniche](#) [◇](#) [Ricetta medica magistrale](#)

Foglio illustrativo <i>MedPop</i>		
Rp.	17996	
Tonsillite, ascessi		
Extr. Salviae fluid.		antiinfiammatorio mucose orofaringee, antibattericida
Extr. Chamom. fl.	aa ad 30	antiinfiammatorio della regione orofaringea, antiflogistico
D. S.	20...30 gtt./bicchiere di acqua calda; gargarismi ogni mezz'ora alternati fino all'apertura dell'ascesso.	Il rimedio viene impiegato, soprattutto in forma di gargarismi, come antiflogistico nelle infiammazioni della regione orofaringea (gengiviti e stomatiti).
Controindicazioni, effetti indesiderati, incompatibilità:		
Prudenza alla salvia nei casi di epilessia per il fatto che potrebbero comparire convulsioni di tipo epilettico.		
<small>osservazioni</small>		
<small>© Co by B. Buser & P. Forster no-2.5-it</small>		

2. Osservazioni

Epidemiologia

Maggiormente colpisce i bambini fino ad un età di 10 anni (soprattutto se causata da streptococchi).

Se causata da streptococchi, la trasmissione avviene soltanto tramite stretto contatto, questo contatto deve avvenire durante la fase iniziale della malattia, quando l'infezione scatena le sue prime manifestazioni, in seguito la probabilità diminuisce notevolmente.

Invece alcune forme dovute ad adenovirus sono molto contagiose, diffondendosi rapidamente in ambienti circoscritti quali piscine o similari.

Sintomi

Manifestazioni tipiche di tale infiammazione sono la febbre, astenia, anoressia, cefalea, faringodinia, disfagia, abbassamento di voce

Il tema è approfondita nei seguenti scritti:

- [Ricettario vie respiratorie](#) MmP 10
- [Vie respiratorie](#) Lucidi MmP 10.3
- [Malattie respiratorie](#) Dispensa PT 5.1

3. Allegati

3.1 Motori di ricerca

[FreeFind](#)

[Categorie](#) [SiteMap](#)
MedPop MedPop

[Google: MedPop](#)

Vai

Vai

3.2 Collegamenti

[Tonsillite](#) it.Wikipedia ◇ [Tonsillite, ascessi](#) nei domini di MedPop

3.3 Commenti

alla pagina *Foglietti / Tonsillite, ascessi*



[MedPop](#)

[Novità](#)

[Enciclopedia](#)

[Forum](#)

[Redazione](#)

[CSA](#)

[Immagini](#)



Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=Foglietti.17996>
Ultima modifica: September 23, 2008, at 07:16 PM