



Ricettario nervoso - sensoriale ← RicettariMagistrali

[HOME](#) ◇ [.php](#) ◇ [.html](#) ◇ [.pdf](#)

[Fitoterapia](#) ◇ [Ricettario](#) ◇ [Erboristeria](#) ◇ [Galenica](#)

Ricettari MedPop: [Erboristeria](#) [Galenica](#)

[Indici](#) [Introduzioni](#) [Popolari](#) [Tradizionali](#) [Foglietti](#) [Mat.med.Pop.](#) [Fitoterapia](#) → ↓ [Fitorimedi](#) ↓


Pagine nel gruppo *RicettariMagistrali*:

[Preparazioni magistrali](#) ① ◇ [Ricettario circolatorio](#) ◇ [Ricettario dermico](#) ◇ [Ricettario digestivo](#) ◇ [Ricettario locomotore](#) ◇ [Ricettario ormonale](#) ◇ [Ricettario respiratorio](#) ◇

Ricettario nervoso - sensoriale indice (sopprimi)

1. [Ricettario sistema nervoso](#)
 - 1.1 [sistema nervoso centrale](#)
 - 1.2 [nervi periferici](#)
 - 1.3 [neurovegetativo](#)
 - 1.4 [nervosismo pediatrico](#)
2. [Ricettario organi dei sensi](#)
 - 2.1 [disturbi visivi](#)
 - 2.2 [disturbi dell'orecchio](#)
3. [Allegati](#)
 - 3.1 [Nozioni](#)
 - 3.2 [Motori di ricerca](#)
 - 3.3 [Commenti](#)

[P. Forster](#) | [B. Buser +](#)



a cura di [Daniela Rüegg](#)



clickare per disclaimer

Fonti: [Diagnostica nervosa](#) ◇ [Malattie del sistema nervoso](#) ◇ [Malattie degli organi di senso](#) ◇ [Diagnostica nervosa](#) ◇ [Patologia Sistema nervoso centrale](#) ◇ [Patologia Sistema nervoso periferico](#) ◇ [Patologia neurovegetativa](#) ◇ [Introduzione alla psicopatologia](#)

→ [Abbreviazioni](#) | * → *Cave!* velenoso, non ingerire | ⚠ → *Cave!* legge sugli stupefacenti

1. Ricettario sistema nervoso

Sono trattati i seguenti argomenti:

Ricettario sistema nervoso centrale ◊ Ricettario malattie di nervi periferici ◊ Ricettario disturbi neurovegetativi ◊ Ricettario disturbi nervosi pediatrici



1.1 sistema nervoso centrale

Rp.: A) Morbo di Parkinson, sclerosi multipla (palliativo) orale
 Tinct. Hb. Passiflorae 100 anticonvulsivo
D.S. Mattina e mezzogiorno 1..4 ml (40...160 gtt. in un po' d'acqua tiepida) .

Rp.: C) Morbo di Parkinson, sclerosi multipla (palliativo) orale
 Tremoforat (Klein) Extr.sicc. Belladonna
D.S. Inizialmente 1/2 compr. 3 x dì poi aumentare fino a 1 compr. 6 x dì

Integratori alimentari coinvolti :

F) Epilessia: orale
 B3, B6, E; Mg, Zn, Mn, Se; CIS, TAU, GLU; DMG

G) Sclerosi multipla:
 B1, B6, B12, AP, D, E; Ca, Mg, Zn, Se, Cu; d-FA, CIS

H) Parkinson
 B3, B6, B12, FOL, C, E; Se, Cu; FA, MET, CIS, TRE

Rp.: B) Morbo di Parkinson, sclerosi multipla (palliativo) orale
 Tinct. Passiflorae 40 anticonvulsivo
 Tinct. Belladonnae 5 spasmolitico
 Tinct. Datura Ⓐ stram. 10 antitremore
D.S. Mattina e mezzogiorno 20 gtt. in un po' d'acqua tiepida.

Rp.: D) Parkinson, sclerosi multipla (integratore lipidico) orale
 Ol. Lini 350
 Ol. Oenotherae
 Ol. Nigellae
 Ol. Fegato di merluzzo aa 150
 vit. E 5
D.S. Emulsionare 1 cucchiaio da minestra con della ricotta e ingerire durante la colazione per almeno 3 mesi.

Rp.: E) Epilessia (palliativo) orale
 Tinct. Fl. f. Cannabis Ⓐ 100 (anticonvulsivo)
D.S. 5 ml più volte al giorno.



1.2 nervi periferici

Sono trattati i seguenti argomenti:
[Nevralgie](#) ♦ [Parestesie](#) ♦ [Herpes zoster](#)

Nevralgie

it. Wikipedia: [Nevralgia](#)

<p>Rp.: A) Nevralgie topico</p> <p>Aeth. Garofano 3 anestetizzante</p> <p>Aeth. Camom.ric. 0,5 antinfiammatorio</p> <p>Aeth. Lavend. 1 calmante</p> <p>Ol. Nigellae antistaminico</p> <p>Ol. Oenotherae aa ad 30 nervonutriente</p> <p>D.S. Applicare più volte al giorno poche gocce sulla parte dolente.</p>	<p>Rp.: B) Nevralgie topico</p> <p>Tinct. Aconiti 10 ✖</p> <p>Tinct. Prunus lauri 10 ✖</p> <p>Xylocaine (2%) 8 anest.</p> <p>Aeth. Menthae 1 anest.</p> <p>Aeth. Garofano 1 anest.</p> <p>Aeth. Gelsemii 0.1 anest.</p> <p>D. ad vitr. nebulizzatore S. NON INGERIRE e attenzione agli occhi. Agitare prima dell'uso. Spruzzare sulla regione dolorosa.</p>
<p>Rp.: B1) Nevralgia sciatica topico</p> <p>Ung. <u>Ricostr. tess. connettivo</u> 95</p> <p>Ol. Capsicum 3</p> <p>DMSO₂ (dimetilsolfato) 2</p> <p>D.S. Applicare più volte al dì sulle parti dolenti</p>	<p>Rp.: C) Nevralgie orale</p> <p>Tinct. Petasites 50 antidolorifico, spasmolitico</p> <p>D.S. Cura a lungo termine: ingerire 40 gocce 2 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida. In caso di forti dolori: ingerire da 40...80 gocce al mass. 5 volte al giorno.</p>
<p>Rp.: F) Nevralgie orale</p> <p>Tinct. Lupuli calmante</p> <p>Tinct. Ginseng costitutivo</p> <p>Tinct. Hyperici antinfiammatorio</p> <p>Tinct. Piscidiae aa ad 200 antidolorifero nervino</p> <p>D.S. Ingerire 2 x dì 2 ml</p>	<p>Rp.: D1) Nevralgie e sciatica orale</p> <p>ANCOPIR (Vit. B1, B6, B12)</p> <p>cianocobalamina (vitamina B12) 0,3mg, piridossina cloridrato (vitamina B6) 100mg, tiamina nitrato (vitamina B1) 200mg</p> <p>D.S. secondo <u>foglietto illustrativo</u></p>
<p>Rp.: E) Nevralgia facciale topico</p> <p>Ol. coct. Cannabis 30 distensivo</p> <p>Aeth. Bergamotte 1 nervocalmante</p> <p>Aeth. Garofano gtt. X anestetico locale</p> <p>Aeth. Menthae gtt. XV analgesico locale</p> <p>D.S. Spalmare un pò di olio sulla zona dolente ogni qualche ora, facendo attenzione agli occhi</p>	<p>Le diverse nevralgie (trigemino, postterpetica, sciatica, parasternale, tibiale) sono difficili da affrontare. Quando la causa è data da "nervi incastrati", il lavoro corporeo serve per liberarli (p.es. con coppette). Altri casi richiedono anche antidolorifici.</p>



Parestesie

it. Wikipedia [Parestesia](#)

<p>Rp.: G) Parestesie locali, riparazione nervosa topico</p> <p>Aeth. Basilico 1 nervostimolante</p> <p>Ol. Oenotherae</p> <p>Ol. Arnicae aa ad 30 capillardilatante</p> <p>D.S. Spalmare sulla parte dolente più volte al dì poche gocce.</p>	<p>La causa di ogni parestesia persistente è da chiarire dal neurologo. Se si tratta di un nervo leso, la ricetta a fianco può ridurre il tempo di rigenerazione.</p>
---	---

Herpes zoster

<i>Herpes zoster it. Wikipedia</i>	
<p>Rp.: H) Herpes zoster orale</p> <p>Tinct. Echinaceae 30 antivirale Tinct. Valerianae calmante Tinct. Stram. Avena neurotonico Tinct. Hyperici antinfiamm. Tinct. Passiflorae antidolorifero Tinct. Piscidiaae aa ad 200 antidolorifero</p> <p>D.S. Ingerire 3 ... 5 x dì 2 ml (pipette) in un pò di acqua tiepida.</p>	<p>Rp.: J) Herpes zoster topico</p> <p>Aeth. Bergamottae calmante nervino Aeth. Eucalipto aa 2 antivirale Aeth. Lavandae 1 calmante Aeth. Camomillae antinfiammatorio Aeth. Menthae aa 0.5 anestetizzante Alcol ad 50</p> <p>m.f. Tinct. D.S. Scuotere bene prima dell'uso. Applicare con un pennello morbido più volte al dì sulle parti dolenti. <i>Ev. bagno serale con 5 ml diluito in un cucchiaino di minestra di panna.</i></p>
<p>Rp.: K) Herpes zoster (anestetizzante) topico</p> <p>Talco mentolato farmacia</p> <p>D.S. Applicare sulle parti dolenti.</p>	<p>Rp.: G) Herpes zoster topico</p> <p>Aeth. menta gtt. I anestetizzante Ol. Oenotherae Mod.prostagland. Ol. Nigella aa ad 30 antinfiammatorio</p> <p>D.S. Spalmare sulla parte dolente più volte al dì.</p>
<p>Rp.: L) Dolori post Herpes zoster topico</p> <p>Aeth. Melaleuca antivirale Aeth. Lavendulae antivirale Aeth. Melissa aa ad ml 8 antivirale Ol. oliva o mandorle ml 90</p> <p>D.S. Scuotere bene prima dell'uso. Applicare più volte al dì sulle parti dolenti.</p>	



Eruzioni virali

<i>Herpes it. Wikipedia</i>	
<p>Rp.: Eruzioni cutanee virali topico herpes</p> <p>Moneta di argento I viricide</p> <p>D.S. premere leggermente sull'eruzione per qualche minuto; se l'eruzione è lunga, eseguire il procedimento "a passi". Pulire la moneta prima e dopo l'applicazione con acqua e sapone per sgrassarla.</p>	<p>In medicina popolare il metodo si chiama "segnare" e ha una reputazione magica, anche se è una chiara applicazione germicida dell'argento.</p>



1.3 neurovegetativo

Sono trattati i seguenti argomenti:

Insonnia ◇ Anafrodisiaco / Afrodisiaco masch. ◇ Antidepressivi ◇ Esaurimento nervoso ◇ Distonia neurovegetativa ◇ Paure, ansia, fobie ◇ Distonia neurovegetativa ◇ Mal di testa ◇ Eemicranie

Insonnia

it. Wikipedia Insonnia

Consiglio banale:

- 5 minuti di passeggiata all'aria fresca
- uno ... tre birrini

prima di dormire

Rp.: B) Insonnia orale

Tinct.	Valerianae	20
Tinct.	Humulus lupulus	15
Tinct.	Passiflora	15

D.S. Ingerire 1..4 ml prima di dormire.

Rp.: E) Difficoltà ad addormentarsi orale

Fol.	Melissa	150 (calmante cardiaco)
------	---------	-------------------------

D.S. Infusione 2 ct/tazza addolcita con miele. 1 tazza dopo cena. e 1 tazza prima di dormire.

Rp.: E1) Difficoltà ad addormentarsi topico

Hb.	Origani	
Hb.e Fl.	Lavendulae	
Hb.	Cannabis Ⓐ	aa ad 400

f.cuscino per dormirci sopra. **S.** Integratori alimentari: Cu

Rp.: A) Insonnia orale

Rad.	Valerianae conc.	150 (sedativo)
------	------------------	----------------

m.f. Infusione 2 ct/tazza, macerare per almeno 12 ore.

Rp.: Insonnia orale

Tinct.	Valerianae	200 (sedativo)
--------	------------	----------------

D.S. ingerire da 1 ... 5 c.t. in acqua tiepida prima di dormire

Rp.: C) Insonnia (intolleranza Valeriana) orale

Tinct.	Rad. Angelicae	20
Tinct.	Fol. Rosmarini	10
Tinct.	Fol. Melissa	30
Tinct.	Flor. Lavendulae	10
Tinct.	Strobuli lupuli	20
Tinct.	Hb. Millefolii	10

D.S. Ingerire in un po' d'acqua tiepida 2 ml prima di dormire.

Rp.: C2) Insonnia, integratori alimentari orale

compl. B (B1, B3, B6, ...) AP; TF, GLU; INO, MEL

Rp.: C1) Insonnia (intolleranza Valeriana) orale

Tinct.	Cannabis	15
Tinct.	Lupuli	10
Tinct.	Passiflora	5
Tinct.	Belladonna	gtt. LX

D.S. 1..2 pipette 1/2 ora prima di dormire.



Anafrodisiaco / Afrodisiaco masch.

<i>it. Wikipedia Afrodisiaco</i>	
<p>Rp.: Anafrodisiaco maschile orale</p> <p>Camphorae (calmante) monobromatae Gland. Lupuli aa 0.5 (Reg. Testosterone)</p> <p>m.f. pulvis D. tal. Dos. No. XII ad chart. cerat. S. 3 x dì</p>	<p>Rp.: Afrodisiaco maschile orale</p> <p>Compr. Yohimbina</p> <p>D.S. 50 ... 100 mg per dose.</p>

Tradizionalmente si ritengono anafrodisiaci: Salice bianco, Ninfea, Luppolo e Lattuga virosa

Si ritengono afrodisiaci anche: Eleuterococco, Epimedium, Salvia, Rosmarino, Santoreggia, Menta, Guaranà, Zenzero, Damiana, Ginseng, Noce vomica, Echinacea, ...

Ai tempi, per avere un effetto afrodisiaco, i maschi usavano i cantaridi (*Lytta vesicatoria*) e anche i lombrichi polverizzati. Pur essendo molto efficaci nel favorire l'erezione (promuovono l'irrorazione del bacino) sono lesionistici in quanto causano una forte irritazione ai reni.



Antidepressivi

<i>it. Wikipedia Disturbo depressivo</i>	
<p>Rp.: F) Antidepressivo (con forti tensioni, ricetta medica) orale</p> <p>Tinct. Opii [Ⓐ] (Tinct. Thebaic.) 50 (calmante)</p> <p>D.S. Ingerire 3 x dì 5 gtt., aumentando ogni giorno di 5 gtt. fino ad un massimo di 3 x dì 20 gtt. per un mese, poi ridurre.</p>	<p>Rp.: G) Antidepressivo (menopausa, arteriosclerosi), con tensioni e ansie (ricetta medica) orale</p> <p>Tinct. Thebaic. (opii) [Ⓐ] 2 (calmante) Tinct. Strophanti 5 (cardiaco) Tinct. Convallar. 10 (cardiaco) Tinct. Valerianae 20 (sedativo)</p> <p>D.S. 3...4 x dì 10 gtt.</p>
<p>Rp.: H) Antidepressivo (con debolezza fisica e svogliatezza) orale</p> <p>Tinct. Nux. Colae 20 (stimolante) Tinct. Damianae (stimolante) Tinct. Avena sativa (nervotonico) Tinct. Lavandulae Tinct. Rosmarini aa 10 (cardiotonico)</p> <p>D.S. Ingerire 3 x dì 2 ml.</p>	<p>Rp.: I) Antidepressivo (con irrequietudine, svogliatezza e tensioni) orale</p> <p>Tinct. Nux Colae (stimolante) Tinct. Scutellariae (equilibrante) Tinct. Tiliae (equilibrante) (Tinct. Valerianae) aa ad 50 (sedativo)</p> <p>D.S. Ingerire 3 x dì 2 ml.</p>
<p>Rp.: K) Antidepressivo orale</p> <p><u>Hyperforat</u>[®] 250mg Dragées (Klein) Iperico (equilibrante)</p> <p>D.S. secondo l'istruzione del produttore.</p>	<p>Rp.: L) Antidepressivo orale</p> <p>Ol. Hyperici 100 (equilibrante)</p> <p>D.S. Ingerire 1...2 ct 3 x dì</p>
<p>Rp.: N) Antidepressivo orale</p> <p>Tinct. Scutellaria 12 Tinct. Damiana 12 Tinct. Ephedrae ad 30</p> <p>D.S. Ingerire 3 x dì 20...40 gocce</p>	<p>Rp.: M) Antidepressivo orale</p> <p>Tinct. Scutellaria lat. 15 Tinct. Damiana 15 Tinct. Passiflora 15 Tinct. Hypericum ad 100</p> <p>D.S. Ingerire 3 x dì 20...40 gocce.</p>

Rp.: O) Antidepressivo (esogeno): orale

Piper methysticum (Kava-Kava):

- Kavasporal (Müller) (euforizzante, alcol!)
- Kavaform (Dr. Schwab)
- Kavasedon (Gehrlicher GmbH)

D.S. secondo l'istruzione del produttore.

Stati depressivi persistenti vanno diagnosticati e curati dallo psichiatra.

Rp.: N1) Antidepressivo, integratori alimentari : orale

Come integratori alimentari di solito mancano :

- complesso B, specialmente B3;
- minerali, specialmente Mg;
- oligoelementi, specialmente Zn, J, Se.
- Come aminoacidi si usa spesso TF come calmante la sera e FA come stimolante e PABA come equilibrante (non assieme ad antidepressivi).



Esaurimento nervoso

<i>it.Wikipedia <u>Esaurimento nervoso</u></i>	
<p>Rp.: P) Esaurimento nervoso orale</p> <p>Tinct. Nux vomicae (stimolante)</p> <p>Tinct. Valerianae 15 (sedativo)</p> <p>D.S. Ingerire 3 x dì 20 gtt.</p>	<p>Rp.: Q) Esaurimento nervoso orale (intolleranza valeriana)</p> <p>Tinct. Nux vomicae (stimolante)</p> <p>Tinct. Gentianae (tonificante)</p> <p>Tinct. Calami ae 10 (equilibrante)</p> <p>D.S. 3 x dì 20 gtt.</p>
<p>Esaurimento nervoso: orale integratori alimentari:</p> <p>Mancano spesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oligoelementi (Fe, Cr, J, Se) • talvolta anche vitamine: compl. B (FOL, AP). • Degli aminoacidi TRE, CAR. DMG e PABA migliorano spesso l'incentivo. 	



Paure, ansia, fobie, stress

<i>it.Wikipedia: <u>Ansia</u> ◇ <u>Fobie</u> ◇ <u>Stress</u></i>	
<p>Rp.: T) Paure, ansia orale</p> <p>Tinct. Valerianae (sedativo)</p> <p>Tinct. Scutellariae aa ad 30 (equilibrante)</p> <p>D.S. In caso di attacchi ingerire fino a 5 x dì !..2 ml.</p>	<p>Rp.: Ansia, paure, fobie, : orale</p> <p>Piper methysticum (Kava-Kava):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kavasporal (Müller) (euforizzante, alcol!) • Kavaform (Dr. Schwab) • Kavasedon (Gehrlicher GmbH) <p>D.S. secondo l'istruzione del produttore.</p> <p>Nota: Swissmedic ha ritirato la licenza di vendita di tutti e tre i medicinali. Negli altri paesi europei e negli Stati Uniti sono ancora liberamente in vendita.</p>
<p>Rp.: Antistress orale</p> <p>Tinct. Avena nervotonico</p> <p>Tinct. Humulus lupulus sedativo</p> <p>Tinct. Scutellaria aa ad 50 equilibrante</p> <p>D.S. Ingerire 1..3 pipette al dì in poca acqua a digiuno.</p>	



Distonia neurovegetativa

<i>Distonia neuro-vegetativa e depressione medicitalia</i>	
<p>Rp.: U) Distonia vegetativa orale (ricetta medica)</p> <p>Secale conc. (STADA) 0.08 (tonificante) Tinct. Belladonnae (spasmolitico) Tinct. Valerianae aa ad 30 (sedativo)</p> <p>D.S. Ingerire 3 x di 20 gtt.</p>	<p>V) Distonia vegetativa: orale ®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp. Dihydergot® (Sandoz) (secale) (tonificante) • Rp. Tonopres® (Boehringer) (secale) (stimolante) • Rp. Vervipan® (Chefaro) (Valepotriat) (antistressante) • Rp. Baldrisedon® (Schenvich) (Valepotriat) (antistressante) <p>D.S. secondo l'istruzione del produttore.</p>
<p>Rp.: W) Distonia vegetativa orale</p> <p>Tinct. Melissae (calmante cardiaco) Tinct. Rosmarini (tonificante cardiaco) Tinct. Lavendulae aa ad 50 (calmante) Tinct. Rauwolfia 2 (calmante)</p> <p>D.S. Ingerire 3 x di 1 ml.</p>	



Mal di testa

<i>Mal di testa it.Wikipedia</i>	
<p>Rp.: Y) Mal di testa ipertonico orale</p> <p>Tinct. Spirae ulm. 45 (analgesico) Tinct. Rauwolfia 50 (ipotensivo)</p> <p>D.S. In caso di bisogno ingerire 3 x di 1..3 ml. (Cave: intolleranza salicilati!)</p>	<p>Rp.: X) Mal di testa analgesico orale</p> <p>Tinct. Spirae ulmaria 50</p> <p>D.S. In caso di bisogno ingerire 3 x di 1...3 ml (Cave: intolleranza salicilati!)</p>
	<p>Rp.: Z) Mal di testa digestivo orale</p> <p>Tinct. Camomilla (calmante digestivo) Tinct. Absinthii (amaro stomachico) Tinct. Cynaris aa ad 50 (fegato/cistifellea)</p> <p>D.S. 2 ml in un po' di acqua gassata come digestivo.</p>



Emicranie

<i>Emicrania: Terapie it.Wikipedia</i>	
<p>Rp.: Aa) Emicrania "ovulativa" orale</p> <p>Tinct. Agnus casti 7 Tinct. Cannabis Ⓐ ad 30</p> <p>D.S. Ingerire 2 di prima e dopo l'ovulazione 3 x di 20 gtt. In caso di attacchi fino a 50 gtt.</p>	<p>Rp.: Ab) Emicrania autentica: orale</p> <p><u>Cafergot®</u> (Sandoz): compresse o supposte con ergotamina diidergot</p> <p>D.S. secondo la prescrizione del produttore o medico.</p>



1.4 nervosismo pediatrico

Sono trattati i seguenti argomenti:

Tonicanti ◇ Enuresi notturna ◇ Iperattività, deficit di concentrazione ◇ Emozioni "da esame"



Tonicanti

Rp.: R) **Tonico** per ragazzi pallidi, orale
senza appetito e spinta

Tinct.	Nux vomicae	(stimolante)
Tinct.	Chinae	10 (tonificante)
Tinct.	Ferri pomat.	15 (sostit. ferro)

D.S. Ingerire 3 x di 3 gtt. aumentando fino 3 x di 20 gtt. e poi diminuendo fino a 3gtt..

Farselo preparare da un farmacista "alla vecchia maniera".

Enuresi notturna

Enuresi notturna *it.Wikipedia* ◇ Enuresi notturna giustopeso ◇ *MmP: Patologia crescita e sviluppo* ◇ Scolari ◇ Sistema escretore ◇ Patologia urinaria

Rp.: **Enuresis nocturna** orale

Tinct.	Equiseti	50
Tinct.	Rhois aromaticum	25
Tinct.	Agrimoniae	ad 100

D.S. Ingerire la sera da 1 - 2 ml (20 - 40 gtt.) diluiti in poca acqua tiepida

Il preparato non funziona solo per l'infanzia ma anche per l'incontinenza senescente (persino per i cani).



Iperattività, deficit di concentrazione

Sindrome da deficit di attenzione e iperattività *it.Wikipedia*

Rp.: **Iperattività, defidenza di concentrazione in gioventù** orale

Vit. B₆ cmp. 100 mg 300 Streuli

D.S. 4mg per kg di peso corporeo 1 ... 3 volte al giorno

Iperattività e concentrazione sono termini non quantificabili e dipendono quindi dalla valutazione dell' ambiente. I bambini sono di natura "iperattivi" e molte volte serve di più stimolarli che costringerli a star fermi e zitti!



Emozioni "da esame"

Emozioni *it.Wikipedia* ◇ Allergie e emozioni *centroallergietoscane* ◇ Adolescenti *MmP*

Rp.: **Emozioni smisurate "da esame"** orale

Tinct.	Valerianae	50 sedativo
Tinct.	Scutellariae	5 distensivo

D.S. Ingerire fino a tre volte al dì 2 ...3 cucchiari da tè durante gli esami. E basta! è indicato soprattutto la sera.

Rp.: **Stimolante mattutino "per esame"** orale

Tinct.	Ephedrae	stimolante
Tinct.	Scutellariae aa	ad 30 distensivo

D.S. Ingerire fino al massimo tre volte al dì 10 ...40! gtt. solo durante il periodo degli esami! Non ingerire di sera.

2. Ricettario organi dei sensi

Sono trattati i seguenti argomenti:
[Ricettario disturbi visivi](#) ◇ [Ricettario malattie dell'occhio](#)



2.1 disturbi visivi

it. Wikipedia [Oculistica](#) ◇ [Pressione intraoculare](#)

Sono trattati i seguenti argomenti:
[Ipertensione oculare](#) ◇ [Irritazioni](#) ◇ [Infezioni](#)



Ipertensione oculare

Rp.: Turgor occhi	topico
<u>Extr.ligu.</u> Cannabis	10 abbassa la pressione nell'occhio ^(A)
Sale NaCl	0.1 adatta la molarità alle lacrime
Argento pz.	I disinfetta il preparato
D. ad vitrum gutt. S. applicare 1 goccia da 1 ... 3 volte al dì.	

La pressione intraoculare sotto i 21 millimetri di mercurio (mmHg) è entro i valori limite. Una pressione troppo elevata (ipertensione oculare), se non trattata può portare al glaucoma, malattia che può provocare cecità a causa dei danni al nervo ottico.

La pressione oculare elevata non giustifica sempre la diagnosi del glaucoma. Esistono infatti molti casi di ipertensione oculare innocua: consultare l'oftalmologo.



Irritazioni oculari

Rp.: Irritazioni occhio	topico
Idrolato (acqua) di rosa senza alcol: Farfalla [®]	(acqua di rosa da distillazione a vapore).
D.S. compresse con un batuffolo d'ovatta imbevuto, appoggiato sull'occhio per pochi minuti oppure da nebulizzatore o Vitr.gutt.	

Rp.: Irritazioni occhio	topico
Gtt. oftalmiche EUFRASIA [®]	WELEDA
D.S. applicazione secondo indicazioni del produttore.	

Rp.: Irritazioni allergiche occhio	topico
Gtt. oftalmiche BERBERIL [®] (Berberis)	ditta Mann
D.S. applicazione secondo indicazioni del produttore	



Infezioni oculari

Rp.: Infezioni occhio (soccorso)	topico
Tè nero	
Sem. Foeniculi	aa 150
m.f. species D.S. Infuso 3c.t. per dl. Lavaggio occhio e compresse	

Rp.: Infezioni occhio (soccorso)	topico
Sacchetto di tè nero	I
m.f. Infusione; D.S. poi applicare il sacchetto come compressa sull'occhio infettato.	

Rp.: Infezioni occhio orale
 Tinct. Hb. Galii aparines
 Tinct. Rad. Echinaceae ang. aa ad 50
D.S. Ingerire 3 x dì 1 ml

Infezioni persistenti dell'occhio richiedono l'intervento dell'oftalmologo per chiarire se sono ev. virali; in quel caso la cura include colliri o unguenti specifici.

Rp.: Infezioni occhio orale
 Tinct. Hb. Eufrasiae
 Tinct. Rhiz. Iridis vers.
 Tinct. Rad. Phytolaccae dec.
 Tinct. Hb. Galii aparines
 Tinct. Rad. Echinaceae aa ad 50
D.S. Ingerire 3 x dì 1 ml



2.2 disturbi dell'orecchio

it.Wikipedia: [Otorinolaringoiatria](#) [Otiti](#) [Vertigine](#) [Tinnitus, acufene](#)

Sono trattati i seguenti argomenti:
[Mal d'orecchie](#) [Infezioni interne](#) [Infezioni esterne](#) [Tinnitus, acufene, vertigini](#)



Mal d'orecchie

Rp.: Mal di orecchie topico
tradiz.
 Fol. Umbilicus rupestris rec.
f. Succo fresco filtrato con un colino.
S. Poche gocce di succo fresco tiepido nell'orecchio dolente. Chiudere con un pò di ovatta. *Cave!* non usare con timpano otturato.

Rp.: Mal d'orecchie topico
 Tinct. Lobeliae 10
D.S. 1 gt. di tintura tiepida nell'orecchio dolente ogni 4 ore. Chiudere la tuba con un pò d'ovatta.

Non tutti i mal d'orecchi sono infettivi. Ci possono essere anche delle cause nevralgiche, spastiche o altre. Se persiste, rivolgersi all'otorinolaringoiatra.

Rp.: Mal di orecchie topico
 Fl. Chamomillae matr.
f. infusione **D.S.** 1 gt. di infusione tiepida nell'orecchio dolente ogni 4 ore. Chiudere con un pò d'ovatta.



Infezioni interne

Rp.: Infezioni alle orecchie orale
 (sistemiche)
 Tinct. Echinaceae immunostimolante
 Tinct. Fl. Sambuci aa ad 50 immunostimolante
D.S. Ingerire 5 x dì 1 ml in un pò; d'acqua tiepida.

Rp.: Otite acuta (soccorso) topico

Ol.coct.	Fl.Cannab. Ⓐ	30	anestetico spasmolit.
	Mandorla		
Aeth.	Mirrhae	0.2	fungicida
Aeth.	Lavandulae	1	germicida
Aeth.	Caryophilli (garofano)	0.1	anest. antiinf.

D.S. 1 gt. di olio tiepido! nell'orecchio dolente ogni 4 ore. Chiudere il meato con un pò d'ovatta.

Rp.: Otite cronica			topico
Ol.coct. Fl.fem. Cannab.	30	anestetico spasmol.	
Ⓐ / Mandorla			
Aeth. Mirrhæ	1	fungicida	
Aeth. Melaleuca (Tea Tree)	0.1	germicida largo spettro	
D.S. 1 gt. di olio tiepido nell'orecchio 3 x dì Chiudere il meato con un pò d'ovatta.			
Rp.: Infezioni orecchio medio			topico
<i>(inalazione passiva)</i>			
Aeth. Rosmarini	10	battericide, mucolitico	
D.S. Spalmare 1 gt. sotto i lobi nasali ogni volta che si sente una narice chiusa.			

Rp.: Infezioni orecchio medio			topico
<i>(inalazione attiva)</i>			
Aeth. Melaleuca		germicida	
Aeth. Eucalipto		virostatico	
Aeth. Lavandula ang.		battericida	
Aeth. Timo		battericida	
Aeth. Rosmarini.	aa	1	microcircolatorio
Ol. Calendulae			derma-mucotico
Ol. Nigellae	aa	ad 30	antinfiammatorio
D.S. 1 x dì inalare poche gocce in acqua bollente per la durata di almeno 1 mese.			
Rp.: Infezioni orecchio medio			topico
Ol.coct. Fl.fem. Cannabis Ⓐ /	30	Mandorla	
Aeth. Myrrhæ		0.2	



Infezioni esterne

Rp.: Foruncoli tuba esterna, mastoidite			orale
Tinct. Rad. Baptisiae tinct.			
Tinct. Rad. Echinacea ang.	aa	20	
Tinct. Rad. Phytolaccae dec.			
Tinct. Hb. Pulsatillae	aa	ad 60	
D.S. Ingerire 3 x dì 1 ml in un pò d'acqua tiepida.			

Le infezioni esterne intorno all'orecchio sono da curare con particolare attenzione, perché possono ledere l'udito o causare delle encefalite.

Rp.: Foruncoli tuba esterna, mastoidite			topico
Ol. Hypericis		calmante	
Ol. Arnicae		microcircolatorio	
Ol. Calend. aa	ad	30	dermo-mucotico
Aeth. Mirrhæ		0.2	antinfiammatorio
Aeth. Melaleuca		0.3	germicida
Aeth. Caryophilli		0.1	anestetizzante
D.S. 1...3 gtt. di olio tiepido nell'orecchio malato e spalmare sul mastoide dolente. Non tappare l'orecchio per garantire il deflusso sieroso!			



Tinnitus, acufene, vertigini

In casi di acufene o vertigini ripetute, anzitutto si va dall' otorinolaringoiatra per disporre di una diagnosi precisa e differenziata.

Rp.: Tinnitus, acufene, vertigini orale

Tinct. Pervincae 200 circolazione craniale

D.S. 1 ... 3 x di 3ml (pipette) in un pò di acqua tiepida per almeno due mesi.

Rp. Gingko biloba farmacia

D.S. secondo le indicazioni del farmacista.

Rp. Acido nicotinico 50mg farmacia

D.S. 1 ... 3 x di 50mg Cave! Flush

Rp. Nicotinammido 100mg farmacia

D.S. 1 ... 3 x di 100mg

Se la causa delle vertigini sono degli otoliti "incastrati" (BPPV), la mossa di Epley, Dix-Hallpike o Brandt-Daroff può servire.

Rp.: Tinnitus, acufene orale

Tinct. Hydrastis Rhiz. diminuisce linfa cochleare

Tinct. Cimicifuga Rhiz. aa 25 rigeneraz.mucosa cochleare.

Tinct. Pervinca Fol. ad 100 vasodilatatore craniale

D.S. ingerire 2 x di 3ml (pipette) in un pò di acqua tiepida per almeno due mesi.

Non c'è un rimedio affidabile contro le acufene. Molte volte aiuta:

- un lavoro corporeo posturale su nuca e collo,
- in altri casi l'aumento della circolazione craniale,
- in ancora altri una cura che oltre alla circolazione cura anche la linfa e la mucosa cochleare.

Se queste misure non servono, è indicato di affidare la cura a un otorinolaringoiatra.

3. Allegati

3.1 Nozioni

[Prefaccia](#) ◇ [Terminologia galenica](#) ◇ [Sitografia](#) ◇ [Bibliografia](#)



3.2 Motori di ricerca

PopUp: è una funzione che apre una pagina indipendente delle altre sul monitor. Contiene poi i risultati della ricerca.

Ricerca in Redazione:

Pagine nel gruppo *Ricettari Magistrali*:

[Preparazioni magistrali](#) ◇ [Ricettario circolatorio](#) ◇ [Ricettario dermatico](#) ◇ [Ricettario digestivo](#) ◇ [Ricettario locomotore](#) ◇ [Ricettario ormonale](#) ◇ [Ricettario respiratorio](#) ◇



3.3 [Commenti](#)

alla pagina *RicettariMagistrali / Ricettario nervoso - sensoriale*: ev. cliccare sul titolo per stilare un commento



[Enciclopedia](#) [Novità](#) [Forum](#) [Redazione](#) [CSA](#) [Immagini](#)



Originale: <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php/RicettariMagistrali/SensiNervi>
ultima modifica November 02, 2015, at 07:04 PM Cc by [P. Forster](#) nc-3.0-it