

H) Stomatite acuta, faringite cronica

Rp. TM Altheae
 TM Camomillae
 TM Salviae
 TM Malvae aa ad 40

D.S. 1 c.t./bicchiere d'acqua per i risciacqui/gargarismi più volte al giorno.

2.6.3 Xerostomia (sindrome secca)

Bocca anormalmente secca.

I) Xerostomia (ricetta medica)

Rp. Pilocarpin. hydrochloric 0.2
 TM Aurantii 20
 Acqua dist. ad 100

D.S. Ingerire 3 p.d. 1 c.t. (5 ml).

2.6.4 Stomatiti infettive (Ragadi, micotiche)**K) Stomatite angolare (ragadi)**

Rp. Aeth. Melaleucae 01
 Aeth. Lavendulae 01
 Ol. Nigellae 04
 Ol. Calendulae ad 10

D.S. Più volte al giorno spalmare una goccia sulle ragadi.

L) Stomatite micotica

Rp. Aeth. Melaleucae 05
 Aeth. Lavendulae 05
 TM Salviae ad 50

D.S. 1 c.t./bicchiere d'acqua per i risciacqui/gargarismi più volte al giorno.

Esofago**Esofagite cronica di reflusso**

Rp. Nigellae oleum 30 (antistaminico)
 Tinct. Chamomillae (antinfiammatorio)
 Tinct. Belladonnae (spasmolitico)
 Tinct. Altheae (mucillaginoso)
 Lecitina aa ad 50 (emulgatore)

f. emulsione

D.S. Scuotere bene prima dell'uso! Ingerire più volte al giorno 15 gocce in porzioni di 3 gocce in intervalli di 1...2 minuti ("lubrifica" la mucose dell'esofago con le sostanze attive).

Acalisia

Rp. Nigellae oleum 30 (antistaminico)
 Tinct. Dioscorides 5 (spasmolitico)
 Tinct. Belladonnae 10 (spasmolitico)
 Lecitina 5 (emulgatore)

f. emulsione

D.S. Scuotere bene prima dell'uso! Ingerire più volte al giorno 15 gocce.

Stomaco**4.5.1 Gastrite acuta**

Secondo la patologia individuale i singoli ingredienti delle seguenti ricette sono facilmente combinabili (verificare se si tratta prevalentemente di sborne, cene "di mazza" smisurate o sigari troppo forti).

A) Astringente, antiacido

Rp. Fol. Thea nigri
 Hb. Centaurii
 Hb. Absinthii aa ad 50

M.f. specie

D.S. 2 ct./tazza più volte al giorno preferibilmente senza addolcire.

B) Calmante, spasmolitico, anestetico

Rp. Hb. Menthae pip. 50

D.S. 2/ct./tazza più volte al giorno.

C) Antinfiammatorio, antiacido

Rp. Fl. Chamomillae 50

D.S. 2 ct./tazza più volte al giorno, preferibilmente prima dei pasti.

C1) “Digestivo dei grassi”

Rp. Aeth. Rosmarini 10

D.S. 1 goccia sulla lingua.

4.5.2 Gastrite cronica, atonia, achilia, anoressia, inappetenza

Sono riportate tre ricette “tipo”. Secondo la patologia individuale i singoli ingredienti sono facilmente combinabili.

D1) Gastrite cronica, achilia, atonia, anoressia infantile

Rp. Tinct. Centaurii

Tinct. Trifolii fibrini

Tinct. Calami aa 30

D.S. 1...2 ml 1/2 ora prima di ogni pasto in un po' d'acqua tiepida.

D2) Atonia spastica

Rp. Tinct. Belladonnae 05

Tinct. Aurantii 20

Tinct Strychni ad 30

D.S. Ingerire 3 p.d. 20 gtt. 1/4 ora prima del pasto in un po' d'acqua.

D3) Inappetenza, anoressia

Rp. Tinct. Cannabis

D.S. Ingerire prima dei pasti 2 ml in un po' d'acqua.

4.5.3 Dispepsia incline a coliche/meteorismo

Secondo la patologia individuale, i singoli ingredienti delle seguenti ricette sono facilmente combinabili.

E) Dispepsia prevalentemente gastrointestinale (achilia)

Rp. Tinct. Menthae pip.

Tinct. Anisi

Tinct. Calami aa ad 30

D.S. 1...2 ml 1/2 ora prima di ogni pasto in un po' d'acqua tiepida.

F) Dispepsia prevalentemente cole-pancreatica

Rp. Tinct. Cardui benedicti

Tinct. Absinthii

Tinct. Melissae aa ad 30

D.S. 1...2 ml 1/2 ora prima di ogni pasto in un po' d'acqua tiepida.

4.5.4 Gastropatia cronica (gastrite secondaria di ulcera, colecistopatia)**G) Gastropatia cronica (gastrite secondaria di ulcera, colecistopatia)**

Rp. Tinct. Foeniculi

Tinct. Menthae pip

Tinct. Melissae

Tinct. Calami aa 40

D.S. Ingerire 1...2 ml 3 volte per giorno in acqua tiepida.

4.5.5 Ulcera gastrica/duodenale

Secondo la patologia individuale i singoli ingredienti delle seguenti ricette sono facilmente combinabili:

H) Cura base

Rp. Extract. chamom. fluid.

(Kamillosan) 100

D.S. 30 gtt. in un bicchiere d'acqua. Ingerire 1/2 ora prima dei pasti.

Sdraiarsi qualche minuto sulla schiena, sul fianco dx., sul fianco sin. e sul ventre (cura a rotolamento).

I) Spasmi gastrici

Rp. Tinct. Belladonnae 20

D.S. In caso di spasmi ingerire 8! gtt. in un po' d'acqua tiepida(ev. aggiungere alla tisana) non più di 5 volte al giorno.

K) Con costipazione

Rp. Tinct. Carvi 05

Tinct. Chamomillae

Tinct. Frangulae aa ad 30

D.S. Ingerire 2 ml in acqua tiepida alla sera prima di dormire.

L) Mucilaginoso/nervinocalmante

Rp. Oleum Hypericis 50

D.S. Ingerire 1 c.t. la mattina a stomaco vuoto.

M) Terapia ortomolecolare per l'ulceraVitamina A 50'000 U.I. solo sotto controllo medico per 1...2 mesi poi abbassare le dosi:
protegge la mucosa gastrica e promuove la guarigione.

oppure Betacarotene 15 mg che ha effetti simili alla vitamina A, ma non si accumula.

Vitamina E 400...800 mg protegge dall'ulcera e promuove la guarigione.

Vitamina C 1...2 gr Non come acido ascorbinico, ma nella forma di ascorbato di sodio o di calcio, ripartito sui cibi giornalieri: mancanza promuove il rischio di ulcera, somministrazione promuove la guarigione.

Zn (forma organica) 50...100 mg promuove la guarigione dell'ulcera specie se somministrato assieme con

Cu (forma organica) 2 mg come "antinfiammatorio".

Intestino**6.11.1 Colon irritabile****A) Cura base**

Rp. Tinct. camomillae 20

Tinct. foeniculi

Tinct. carvi aa ad 30

D.S. Ingerire dopo i pasti 2 ml in un po' d'acqua tiepida.

B) Con spasmi

Rp. Tinct. Belladonnae 10

D.S. Aggiungere alla tisana o alla tintura 5 gtt.

C) Con diarrea

Rp. Fruct. Vaccinium mirtilus sicc. 100

D.S. 3 c.m./1/2 l di acqua, cuocere lentamente per 10 min. Ingerire 3 p.d. 1 tazza (ev. mescolata con ricotta).
Non addolcire!**D) Forme gravi con stress**

Rp. NERVIPAN (Valepotriat)

D.S. Mattina e mezzogiorno 1, sera 2 capsule.

E) Con costipazione

Rp. TM Berberis 12

TM Taraxacis 12

Tinct.Rhamni 06

TM Rhei 06

TM Foeniculis 06

TM Centaurii ad 50

D.S. In caso di necessità ingerire da 40 a 80 gtt. fino a 3 x di 1 c.c. in un po' d'acqua tiepida.

6.11.2 Meteorismo, sindrome di Roemheld, dispepsia**F) Carminativo**

Rp. Aeth. Anisi 1.5

Aeth. Carvi 1.5

Aeth. Cardamomen 1.5

TM Foeniculum ad 50

D.S. Diluire 40 gocce in un bicchiere d'acqua e ingerire, come aperitivo, prima dei pasti fino a 3 volte al dì.

(Gusto di "Pernod")

G) Enzimi antidiseptici

Rp. Papayasanit- Mixtur (enzima/proteolitico) (Vogel & Weber, D-8084 Inning/Ammersee)
 D.S. secondo le indicazioni del produttore.

H) Enzimi antidiseptici

Rp. Nutrizym (Bromelaina, Fel tauri, pancreatica) (Merck)
 D.S. secondo le indicazioni del produttore.

6.11.3 Diarrea

Ogni diarrea provoca forti perdite d'acqua e sali minerali, specialmente di potassio. Vanno in ogni caso e immediatamente sostituiti quanto si può. A diarrea guarita si sostituiscono ev. altri micronutrienti persi e si cura bene l'intestino maltrattato e la flora intestinale, con Joghurt, OMNIFLORIN o altri preparati del genere (chiedere al farmacista).

I) Sostituzione elettroliti

Rp. NaCl	3.5 g (sale da cucina)	1/2 c.t.
Bicarbonato di sodio	2.5 g (bicarbonato)	1/2 c.t.
Cloruro di potassio KCl	1.5 g (REKAWAN)	1/4 c.t.
Glucosio	20 g (miele, dextrosi)	2 c.m.
Acqua H ₂ O	ad 1000g	

(oppure tisane).

D.S. Bere quanto possibile.

Se al momento non è fattibile per mancanza di sostanze, il brodo (animale o vegetale) è un ottimo sostituto. Gli zuccheri vanno presi a parte in forma di destrosio, miele, fruttosio con tisane.

K) Antidiarreico forte

Rp. Rhiz. Tormentillae pulv.	0.5
Fol. Belladonnae pulv.	0.01

M.f. pulv. D. Tal. Dos. Nr. VI S. 3...4 pulv. p.d.

L) Antidiarreico

Rp. Tinct. Tormentillae	30	
Tinct. Belladonnae	05	
Tinct. Carminativae	ad 50	(p.es. ric. F)

D.S. Ingerire 3 p.d. 30 gtt. in un po' d'acqua.

M) Antidiarreico

Rp. Calc. carbonic. subt. pulv.	100
---------------------------------	-----

D. ad scat. S. Più volte al dì una punta di coltello.

N) Antidiarreico

Rp. UZARA (in gocce anche per bambini piccoli)
 D.S. Secondo foglio illustrativo

Ind. Stada
 Arzneimittel AG, Stadastrasse
 D-61118 Bad Vilbel

O) Antidiarreico

Rp. Fruct. vaccinium mirtilis siccae	100
--------------------------------------	-----

D.S. Decotto 3 c.m./1/2 l acqua 10 min. 3 p.d. 1 tazza (ev. mescolata con ricotta). Non addolcire.

P) Postdissenterico, dispeptico fermentativo

Rp. Succus ribes nigrum	1000
-------------------------	------

D.S. 1 bicchiere durante i pasti.

P1) Ricostituente flora intestinale

Rp. BACTISUBTIL (spore battero IP 5832; Escherichia coli)
 Cassella-med GmbH, D-50670 Köln
 D.S. secondo le indicazioni del produttore.

6.11.4 Costipazione

Tutti i lassativi a lungo impediscono la peristalsi e peggiorano la disfunzione che dovrebbero guarire. Nelle seguenti ricette ho tentato di usare combinazioni che impediscono il meno possibile i movimenti peristaltici e per questo motivo mancano droghe come aloe, senna e altri.

Per l'uso del Rhamnus (Frangulus) è da notare che la pianta recente è velenosa e quindi anche la tintura madre (TM). La Tintura officinale (Tinct.) invece è sempre preparato di corteccia stagionata ed è un ottimo lassativo in pratica senza effetti collaterali.

Q) Acuta (purga salinica)

Rp. Sal (mirabilis) Glauberi 50

D.S. Ingerire 1 c.t. in un bicchiere d'acqua. Poi sostituzione di potassio (KCl) p.es. REKAWAN.

R) Acuta (purga oleosa)

Rp. Ol. Rhizini 50

D.S. Ingerire 1 c.m. Poi sostituzione di potassio (KCl) p.es. REKAWAN.

S) Cronica (regolare)

Rp. Semen lini contusus 100 (Linusit Creola, Finck)

D.S. 1...2 c.m. la mattina con yoghurt, musli... Bere 1...2 bicchieri d'acqua.

T) Lassativo

Rp. TM Berberis 048 (cistifellea)
 TM Taraxaci 048 (fegato)
 Tinct. Rhamni (franguli) 024 (lassativo)
 TM Rhei 024 (lassativo)
 TM Foeniculi 024 (carminativo)
 TM Centaurii ad 200 (stomaco)

D.S. In caso di necessità ingerire 80 gocce fino a 3 x dì in un po' d'acqua tiepida.

U) Regolatore digestione

Rp. TM Berberis 12 (cistifellea)
 TM Taraxaci 12 (fegato)
 Tinct. Rhamni (franguli) 06 (lassativo)
 TM Rhei 06 (lassativo)
 TM Foeniculi 06 (carminativo)
 TM Centaurii ad 50 (stomaco)

D.S. Ingerire 2 ml dopo i pasti in un po' d'acqua.

U1) Ricostituente flora intestinale

Rp. BACTISUBTIL (spore battero IP 5832; Escherichia coli)
 Cassella-med GmbH, D-50670 Köln

D.S. secondo le indicazioni del produttore.

U2) Costipazione/Regol. flora intestinale

Lactulosa (forma trasformata di lattosio; "cibo" per diversi microrganismi della flora intestinale).

Diversi prodotti in diverse forme; chiedere al farmacista.

6.11.5 Proctite, Colite ulcerosa

V) Proctite (infiammazione del retto)

Rp. TM Chamomillae (antinfiammatorio)
 TM Tormentillae (astringente)
 TM Rhei aa ad 100 (lassativo)

D.S. Ingerire mattina e sera 2 ml in un po' d'acqua.

W) Proctite, colite ulcerosa

Rp. Fl. Chamomillae (antinfiammatoria)
 Rad. Altheae (mucillaginosa)
 Rad. Liquiritiae (antinfiammatoria)
 Rhiz. Tormentillae aa ad 100 (astringente)

f. Species S. decotto 1 c.m. 10 min. in 2 dl di acqua. Fare clistere 2 p.d.

X) Clisma per proctite, colite

Rp. Oleum Hypericis 50
 Aeth. Chamomillae 0.5

D.S. Clisma duraturo con 1 c.t. la sera.

X1) Antinfiammatorio intestinale

Rp. WOBENZYM N (enzimi proteolitici: ananas, papaya, pancreas)
 Mugos Pharma GmbH + Co D - 82524 Geretsried (reperibile in farmacia).
 D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

X2) Ricostituente flora intestinale

Rp. BACTISUBTIL (spore battero IP 5832; Escherichia coli)
 Cassella-med GmbH, D-50670 Köln
 D.S. secondo le indicazioni del produttore.

6.11.6 Emorroidi

Dopo aver controllato il funzionamento del fegato occorre spesso anche un relativo rimedio.

Y) Cura base

Rp. TM Chamomillae (antinfiammatorio)
 TM Calami (tonico amaro - vena porta)
 TM Foeniculi (carminativo)
 Tinct. Rhamni (frangulae) (lassativo)
 (TM Rusci aesculeati) ad 100 (emazie vene costritt.)
 D.S. Mattina e sera ingerire 1...2 ml in un po' d'acqua.

Z) Compresse emorroidali

Rp. TM Arnicae
 TM Chamomillae aa ad 50
 D.S. 2 c.t./1/2 l acqua. Mattina e sera compresse per un'ora, frequentemente da cambiare.

AA) Pomata emorroidale

Rp. Hamametum-Salbe (Hamamelis, astringente)
 (Schwabe)
 D.S. secondo le indicazioni del produttore.

AB) Supposte contro emazie emorroidali

Rp. Supposte RUSCORECTAL (Ruscus aesculeatus)
 (Searle)
 D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

6.11.7 Diverticolite**AC) Cura base**

Rp. TM Arnica 010
 TM Chamomillae 030
 TM Althaeae ad 100
 D.S. Ingerire 40 gtt. 3 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida.

AD) Acuta

Rp. TM Dioscorea 30 (spasmolitico)
 TM Chamomillae 20 (antinfiammatorio)
 TM Altheae 10 (muccilaginosa)
 TM Calami 10 (tonificante)
 D.S. 3 p.d. 1...2 ml

La terapia ortomolecolare propone le seguenti misure per diverticolosi/costipazione:

- Vitamina C 0.5...3 gr singola dose mattutina cominciando con mezzo grammo di acido ascorbico.
- Complesso vit.B 0.4 mg di acido folico p.es. BURGERSTEIN Vitamin B Komplex 50
- Acido pantotenico 250 mg
- Magnesio 400 mg
- Fibre vegetali 10...20 gr p.es. crusca di frumento con tanto liquido. Iniziare con piccole dosi perché crea inizialmente flatulenza.
- Flora intestinale ev. correggere p.es. con BACTISUBTIL.

6.11.8 Appendicite**AE) Aggiunta alla immediata cura medica!**

Rp. Tinct. Echinaceae	20	(immunostimolante)
Tinct. Dioscoreae	20	(spasmolitico)
Tinct. Chamomillae	10	(antiinfiammatorio)
Tinct. Agrimoniae	10	(antiinfettivo)
D.S. 3 p.d. 1...2 ml		

6.11.9 Colite acuta

Vedi anche: Proctite, colite ulcerosa.

AF) Colite acuta

Rp. Tinct. Dioscoreae	30	(spasmolitico)
Tinct. Tormentillae	20	(adstringente, stiptico)
Tinct. Symphyti		(emmolliente)
Tinct. Altheae		(mucilaginoso)
Tinct. Hydrastis		(immunostimolante)
Tinct. Agrimoniae	aa	10 (antiinfettivo)
D.S. 3 p.d. 2 ml		

Parassiti intestinali**8.6.1 Cestodi, teniadi****A) Cestodi, teniadi**

Rp. LOMESAN
(Bayer)
D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

B) Cestodi, teniadi

Rp. Sem. Cucurbitae non decort. conc. 5 gr/kg peso corporeo.
D.S. Mescolare con latte/miele. Mangiare la mattina a digiuno in 2 porzioni.
Dopo 2...3 ore 2 cucchiari da minestra di olio di ricino come purga.

8.6.2 Ascaridi

(aggiuntiva alla cura medica)

C) Ascaridi: Cura base:

Rp. TM Matricaria discoideae 500
D.S. 2 p.d. 4 ml per 1...2 mesi.

D) Ascaridi: Cura aggiuntiva

Rp. TM Matricariae discoideae
Tinct. Rhamni (franguli)
TM Rhei aa ad 50
D.S. 2 volte alla settimana la sera 4 ml per 1...2 mesi
(aggiuntivo alla cura medica)

8.6.3 Oxiuri**E) Oxiuri attivi:**

Rp. 1 spicchio di aglio tritato
1/4 l di latte
f. decotto. Clisma duraturo ogni settimana.

F)

Rp. TM alii ursini 50
D.S. 6 ml in un po' d'acqua 1 ora prima del clisma come sopra.

G) Oxiuri: cura base:

Rp. TM Matricaria discoidea 500
D.S. 2 p.d. 4 ml per 1...2 mesi.

H) Oxiuri: cura aggiuntiva

Rp. TM Matricariae discoideae
Tinct. Rhamni (franguli)
TM Rhei aa ad 50
D.S. 2 volte alla settimana la sera 4 ml.

I) Oxiuri inattivi (bambini)

Rp. 2 carote rec.

D.S. Mangiare ogni mattina o bere il succo.

Fegato**9.6.1 Epatite virale****A) Epatite virale (stadio viroattivo)**

Rp. Aeth. Lavanda	0.5
Aeth. Melaleuca	0.5
Aeth. Myrrhae	0.5
Aeth. Eucalipti	0.5
Aeth. Bergamottae	0.5
Aeth. Niaouli	0.5
Mass. supp.	ad 100

F. supposte XL D.S. Cura per i primi 10 gg: mettere una supposta ogni sera.

Cura a partire dall'11 giorno: mettere una supposta ogni 2 giorni (10 supposte).

Continuare la cura: mettere una supposta ogni 4° giorno (10 supposte).

Terminare la cura: mettere una supposta la settimana (10 supposte).

B) "Immunostimolante"

Rp. TM Bactisia	10
TM Phytolacca	10
TM Echinacea ang.	15
TM Absinthi Hb	10
TM Myrrhae	ad 50

D.S. Come digestivo: ingerire dopo i pasti 3 x al giorno 1 pipetta in un po' d'acqua tiepida.

9.6.2 Epatite generale**C) "Epatite"**

Rp. TM Cardui Mariae	20
TM Cynara Scoly.	20
Aeth. Mentae pip. gtt.	XX
TM Taraxaci	ad 100

D.S. Come aperitivo: ingerire prima dei pasti 3 x al giorno 1 pipetta in un bicchiere d'acqua.

9.6.3 Ittero**D) Ittero**

Rp. Tinct. Rhiz. Leptandrae virg	
Tinct. Rhiz. Hydrastis	
Tinct. Rad. Taraxaci	
Tinct. Hb. Cheloniae glabrae	
Tinct. Cort. Chionanthi virg fad. aa	ad 100

D.S. 1 ml ogni due ore finché i sintomi persistono.

9.6.4 Epatite cronica**E) Epatite persistente**

Rp. TM Cardui Mariae	20
TM Cynara Scoly.	20
Aeth. Mentae pip.	gtt. XX
TM Taraxaci	ad 100

D.S. Come aperitivo: ingerire prima dei pasti 3 x al giorno 1 pipetta in un bicchiere d'acqua.

F)

Rp. LEGALON

Secondo le indicazioni del produttore.

9.6.5 Disturbi degenerativi del fegato**G) Cirrosi, fegato grasso, fegato leso**

Rp. LEGALON

Secondo le indicazioni del produttore.

9.6.6 Fegato grasso (stearinico)**H) Fegato grasso, aggiunta**

Rp. CYNARIX

D.S. secondo le indicazioni del produttore.

9.6.7 Sostanze ortomolecolari in disturbi epatici

In disturbi epatici sono da controllare ed eventualmente da somministrare:

- Vitamina A o Betacarotene se sono coinvolti disturbi di metabolismo lipidico. Dosi terapeutiche sono da 10'000...40'000 U.I. di vitamina A, corrispondenti a 3...12 mg di Betacarotene. Vitamina A è da somministrare sotto controllo medico. È p.es. contenuto in olio di pesce HALIBUT (Adroka AG, CH-4123 Allschwil) in 7'500 U.I. per capsula. La betacarotene è meno critica perché non viene accumulata nell'organismo (p.es. BURGER-STEIN Betacarotin 6 mg o 15 mg).

- Zinco nella forma organica se sono coinvolti i disturbi enzimatici (transaminasi). Le dosi terapeutiche sono indicate con 20...100 mg (p.es. BURGERSTEIN Zinkvital 15 mg per pastiglia, o UNIZINK 50 mg per pastiglia).

Colecisti**10.8.1 Colecistite****A) Colecistite**

Rp. TM Altheae				040
TM Taraxaci				
TM Mahoniae				
TM Euonymi				
TM Chionanthi	aa	ad		120

D.S. 3 p.d.2 ml

10.8.2 Colelitiasi**B) Colelitiasi: cura base**

Rp. TM Altheae				40
TM Boldo				
TM Hydrastis				
TM Cheloniae				
TM Chionanthi	aa		ad	120

D.S. 3 p.d. 2 ml

10.8.3 Spasmolitici**C) Spasmolitico**

Rp. Oddibil (fumaria)
(L. Merckle, D-7902 Blaubeuren)

D.S. 4...6 pastiglie in caso di coliche.

C1) Spasmolitico

Rp. Tinct. Belladonnae				10
------------------------	--	--	--	----

D.S. 6...8! gtt. fino a 5 volte al giorno.

C) Spasmolitico

Rp. Tinct. Dioscorides				50
------------------------	--	--	--	----

D.S. 20 gtt. ogni 2 ore fino all'esaurimento della colica.

10.8.4 Discinesia/distonia colica**D) Discinesia/distonia colica**

Rp. TM Petasite				100
-----------------	--	--	--	-----

D.S. 3 p.d. 1 ml

10.8.5 Sostanze ortomolecolari per colelitiasi

Vitamina E	400...800 mg	Protezione della colelitiasi e può sciogliere calcoli.
Vitamina C	1 gr	Allenta i sintomi.
Taurina	1 gr	Ruolo importante nel metabolismo biliare.

