

Raccomandazioni per vaccinazioni di bambini

Arbeitsgruppe für differenzierte Impfungen

<http://www.impfo.ch>

Età	mesi anni	3	5	7	9	13	14	15	18	24	27	120	150	
						1				2		10	13	15
														>15
Difterite														
Tetano														
Polio														
(Pertussis)														<i>in caso di rischio aumentato</i> (p.es. Asilo Nido a 2 ... 3 anni)
(Emofilo)														<i>in caso di rischio aumentato</i>
(Morbillo)														<i>se non fatto, ev. Test anticorpi e vaccinazione</i> <input type="checkbox"/> ???
(Rosolia f.)														<i>se non fatto, Test anticorpi e vaccinazione per f.</i> <input type="checkbox"/>
(Orecchioni m.)														<i>se non fatto, Test anticorpi e vaccinazione per m.</i> <input type="checkbox"/>
(Epatite B)														<i>rischi sangue</i>
(Epatite A)														<i>solo in viaggi con igiene molto scarsa</i>
(FSME: zecche)														<i>solo in regioni altamente intasate</i>
secondo il concetto di http://www.impfo.ch/ "Arbeitsgruppe für differenzierte Impfungen"										Vaccinazioni non citate solo in caso di esigenza clinica o primo di viaggi in regioni con prescritta vaccinazione per determinate malattie infettive. (Istituto tropicale, Basilea)				
Drs. med. H.U. Albonico & Peter Klein et coll.														

Indispensabili
 Differenziato
 Superfluo